

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka diambil kesimpulan bahwa kelompok responden yang kurang tepat waktu tanggapnya lebih banyak 82,5%, dari yang tepat waktu tanggapnya dengan banyak 17,5% dari keseluruhan jumlah yang terdiri dari 40 responden dengan kriteria

1. Terdapat 33 responden yang tidak tepat waktu tanggapnya 82,5%
2. Terdapat 7 responden yang tepat dalam waktu tanggapnya 17,5%
3. Terdapat 14 responden yang tidak beresiko 35,0%
4. Terdapat 26 responden yang beresiko 65,0%
5. Ada hubungan waktu tanggap dengan syok hipovolemik

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan diatas ada beberapa saran yang peneliti sampaikan

1. Bagi lahan

Disampaikan kepada lahan agar lebih memperhatikan waktu tanggap perawat dalam penanganan pasien terutama pada pasien fraktur terbuka sehingga dapat mengurangi terjadinya resiko syok hipovolemik

## 2. Bagi institusi

Dapat dijadikan bahan ajar bagi para dosen dan juga masukan atau informasi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan tentang keperawatan gawat darurat yaitu tentang hubungan waktu respon pasien dengan fraktur terbuka yang dilakukan oleh perawat dengan kejadian syok hipovolemik

## 3. Peneliti selanjutnya

Hasil peneliti ini digunakan sebagai data awal untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan waktu tanggap perawat dalam penanganan pasien fraktur terbuka dengan resiko terjadinya syok hipovolemik untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan diharapkan kepada penelitian lain untuk dapat meneruskan penelitian ini secara spesifik dengan variable-variabel yang berbeda.