

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai tingkat pengetahuan ibu terhadap penanganan dan pengobatan diare dipuskemas Hebybhulu Yoka dapat disimpulkan ibu dengan pengetahuan tinggi sebesar (52,5%) dan rendah sebesar (47,5%) serta dengan uji Chi-square pada faktor internal dan eksternal tingkat pengetahuan dan tindakan pencegahan yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, pengalaman diare pada anak, memberikan ASI, dan lama pemberian ASI pada tingkat pengetahuan hanya didapatkan 2 faktor internal ibu, usia dan pendidikan yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan kenapa dikatakan berhubungan karena nilai p-value <0,05, pada tindakan pencegahan diare hanya terdapat 1 faktor yang berhubungan yaitu memberikan ASI. Kemudian untuk keberhasilan tindakan pencegahan diare pada anak dipuskemas Hebybhulu yoka tidak di pengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu.

5.2 Saran

1. Peneliti berharap agar dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare dipuskemas Hebybhulu Yoka.
2. Peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuisisioner terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian.
3. Puskesmas serta pelayanan kesehatan harus melakukan lebih banyak penyuluhan kepada masyarakat sekitarnya mengenai pelayanan kesehatan terutama tentang pencegahan diare mulai dari kebersihan lingkungan, pembuangan sampah pada tempatnya, dan cara mencuci tangan yang benar.